SÍNDROME BRONQUIAL OBSTRUCTIVO EN NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS

FLUJOGRAMA DE DECISIÓN TERAPÉUTICA SEGÚN PUNTAJE CLÍNICO DE TAL (CON FRECUENCIA CARDÍACA)

AL INGRESO, EVALUACIÓN INICIAL

PUNTAJE DE TAL
(Sin fiebre, sin Oxígeno, lo más tranquilo posible)

TAL 4 o menor
→ 2 paff de Salbutamol (200 mcg) y observar 20 min.
→ EN DOMICILIO
Tratamiento con Salbutamol
2 paff cada 6 horas.
Citar a control en 24 hs.
Explicar signos de alarma.

SI NO MEJORA →

TAL 5-6-7-8
(TAL 7 y 8: Oxígeno por cánula nasal)
→ 2 paff de Salbutamol, cada 20 minutos, 3 veces

TAL 9 o mayor
→ Derivación al Hospital
con Oxígeno por cánula nasal
+
2 paff de Salbutamol
cada 20 minutos.

A LA HORA, SEGUNDA EVALUACIÓN

TAL 5 o menor
→ EN DOMICILIO
Tratamiento con Salbutamol
2 paff cada 6 horas.
Citar a control en 24 hs.
Explicar signos de alarma.

TAL 6-7-8
(TAL 7 y 8: con Oxígeno)
→ 2 paff de Salbutamol, cada 20 minutos, 3 veces
Si es 2º episodio,
Metilprednisona 1 mg/kg/dosis V.O.

TAL 9 o mayor
→ Derivación al Hospital
con Oxígeno por cánula nasal
+
2 paff de Salbutamol
cada 20 minutos.

A LAS DOS HORAS, EVALUACIÓN FINAL

TAL 5 o menor
→ EN DOMICILIO
Tratamiento con Salbutamol
2 paff cada 6 horas.
Citar a control en 24 hs.
Explicar signos de alarma.

TAL 6 o mayor
→ Derivación al Hospital
2 paff de Salbutamol
cada 20 minutos.
Con puntaje 7 o mayor:
Oxígeno con cánula nasal

PUNTAJE CLINÍCO DE GRAVEDAD DE TAL

LEVE ≤ 4 • MODERADA = 5 a 8 • GRAVE = 9 a 12

Puntaje	FC	FR		Sibilancias	Uso de músculos accesorios
		< de 6 meses	> de 6 meses		
0	< de 120	< de 40	< de 30	NO	NO
1	120 - 140	40 - 55	30 - 45	Fin de espiración	Tiraje subcostal
2	140 - 160	55 - 70	45 - 60	Inspiración / Espiración	Tiraje subcostal e intercostal
3	> de 160	> de 70	> de 60	Audible sin estetoscopio	Tiraje generalizado

EL PUNTAJE MINIMO ES 0 Y EL MAXIMO 12

Por ejemplo, un niño mayor que presenta:
FC:120-140; FR45-60; sibilancias al final de la espiración;
uso de músculos accesorios: NO
Tiene un puntaje clínico de 4. Se suma 1+2+1+0 respectivamente.

LAVADO DE MANOS

Antes y después
de cada paciente con:
- Agua y jabón, o
- Alcohol gel

DERIVACIÓN ABSOLUTA PARA INTERNACIÓN:

- Edad menor de 1 mes.
- Enfermedad pulmonar crónica (displasia broncopulmonar, EPOC posviral, fibrosis quística).
- Enfermedad general: cardiopatía congénita, desnutrición, inmunodeficiencia, u otras.
- Apnea.

COBERTURA UNIVERSAL de SALUD
Ministerio de Salud
Presidencia de la Nación